

## Глюкотест

Пищевой продукт для специальных медицинских целей Глюкотест ТМ (со вкусом апельсина).

**Состав, 300 ml (мл), бутылка:** вода, моногидрат глюкозы, регулятор кислоты (лимонная кислота), краситель (бета-каротин), консерванты (сорбат калия и бензоат натрия), натуральный компонент апельсина.

### Рекомендации к употреблению:

- с целью проведения теста на толерантность к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета,
- в состояниях гипогликемии у лиц с распознанным диабетом, например после передозировки инсулином;
- при недоборе углеводов или истощении, например, после длительного физической нагрузки.

**Продукт предназначен для взрослых лиц и детей по достижении 3 лет.**

**Перед применением требует консультации и назначения врача.**

**Потребляется под наблюдением врача.**

Перед использованием, для того, чтобы получить однородную суспензию, необходимо тщательно встряхивать флакон в течение не менее 30 сек.

### Способ применения:

- с целью проведения теста на толерантность к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета:

● **для взрослых, беременных женщин и детей по достижении 3 лет:** доза глюкозы, которая принимается во время теста составляет 1,75 g / kg (г / кг) массы тела, максимальная доза составляет 75 g (г), то есть полностью содержимое бутылки Глюкотест

™. Тест необходимо выполнить без предварительного ограничения потребления углеводов (более 150 g (г) углеводов в сутки) и обычной физической активности, утром, натощак и в отдохнувшем состоянии. Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8-14 часов (можно пить воду). Последний вечерний прием пищи должен содержать 30-50 g (г) углеводов. За 10-15 часов перед проведением теста не употреблять алкоголь. Ночью перед тестом и до его окончания не курят. Двухчасовой период между выпитым раствором и получением образца крови, человек, которого исследуют, должен провести на месте выполнения теста, в состоянии покоя;

- **для взрослых и детей с массой тела  $\geq 43$  kg (кг):** после сдачи анализа на показатель глюкозы в венозной крови натощак необходимо выпить полностью содержимое бутылки, то есть 75 g (г) глюкозы в течение 3-5 мин. Последующий анализ на показатель глюкозы в венозной крови выполняется через 120 минут

- **для детей массой  $<43$  kg (кг):** дозировка глюкозы определяется врачом с учетом актуальной массы тела ребенка. На основании назначенного дозирования глюкозы и ее содержания в растворе (100 ml (мл) = 25 g (г) глюкозы) - рассчитывается объем раствора, который необходимо выпить. Тест выполнить аналогично, как в случае для лиц с массой тела  $\geq 43$  kg (кг).

- в состоянии гипогликемии, недостатка углеводов или истощения:

- в случае необходимости, время от времени можно принимать от 3 до 6 ложек раствора соответствует 10-20 g (г) глюкозы.

**Срок применения:** согласовывать с врачом.

**Внимание:** Несоблюдение рекомендаций по способу употребления может привести к негативным последствиям для здоровья. Продукт предназначен только для перорального применения. Беременные и кормящие женщины, лица с диабетом могут принимать данный продукт после врачебной консультации. Однократное употребление большого количества глюкозы может вызвать тошноту и рвоту. Продукт нельзя применять после истечения срока годности указанного на этикетке. Не применять, если есть подозрение, что упаковка была ранее открыта или повреждена. Обладает мочегонными свойствами.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.

**Условия хранения:** хранить при температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке. Беречь от воздействия света. Беречь от тепла, солнечного света или влаги. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

**Срок годности:** 2 года. После первого вскрытия хранить при температуре не выше 25 ° С или в холодильнике в оригинальной упаковке не более 30 дней. Рекомендуем отметить дату первого использования на этикетке.

**Принять до:** см. маркировки.

**Номер партии:** см. маркировки.

**Форма выпуска:** раствор для приема внутрь, 300 ml (мл).

**Не содержит генетически модифицированных организмов (ГМО).**

**Не содержит глютен.**

**Не является лекарственным средством.**

**Производитель:** Мастерз Сп. с о.о., Висоготово ул. Скужевска 30 62-081 Пшежмиерово, Польша (MASTERS Sp. Z o.o., Wysogotowo ul. Skórzewska 30 62-081 Przeźmierowo, Polska).

**Заявитель / Импортер / Представитель в Украине:** ООО «ЭКОКИДС», 03148 Киев, Украина, ул. Семьи Сосниных 3, тел. / Факс: 044 273 57 48.

**Протокол испытаний №565 / 1 от 22.05.2020**