

Аксобрекс

Інструкція для застосування

Аксобрекс

СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дієтична добавка

Склад: (на 1 таблетку): цитиколін – 250 мг, кальцію фосфат, мікрокристалічна целюлоза, полівінілполіпіролідон, магнієві солі жирних кислот, тальк, діоксид кремнію. Харчова (поживна) цінність 100 г: білки – 0 г; жири – 0 г, вуглеводи – 2,5 г. Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту: 10,0 ккал

Властивості цитиколіну:

- сприяє підвищенню рівня мозкової діяльності, зниженню рівня амнезії, поліпшенню стану при когнітивних, сенситивних і моторних розладах, що спостерігаються при ішемії мозку;
- допомагає стимулювати біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, що сприяє покращенню функцій мембран, у тому числі функціонуванню іонообмінних насосів і нейрорецепторів;
- бере участь у пригніченні діяльності деяких фосфоліпаз, перешкоджанні залишковому вивільненню вільних радикалів, попередженні пошкодження мембранних систем та забезпеченні збереження захисної антиоксидантної системи;
- виявляє протинабрякові властивості, має позитивний вплив у зменшенні набряку мозку, завдяки стабілізуючій дії на мембрану;
- може стимулювати зменшення об'єму пошкодженої тканини, сприяючи зменшенню ризику загибелі клітин, діючи на механізми апоптозу, і допомагає поліпшувати холінергічну передачу;
- сприяє функціональній реабілітації при гострих порушеннях мозкового кровообігу, здійснюючи позитивний вплив на зменшення ішемічного пошкодження тканин мозку;
- допомагає скорочувати тривалість відновного періоду і зменшувати інтенсивність посттравматичного синдрому при черепно-мозкових травмах».

Рекомендації до споживання: аксобрекс може бути використаний за рекомендацією лікаря в якості додаткового джерела до раціону дієтичного харчування дорослих, що сприяє:

- покращенню концентрації уваги
- підвищенню інтенсивності розумової діяльності
- покращенню пам'яті в умовах підвищеного інтелектуального навантаження,
- покращенню мозкового кровообігу

Рекомендовано вживати: дорослим по 1 таблетці 1-2 рази на день під час їжі. Тривалість прийому 15-30 днів, більш тривале застосування узгодити з лікарем.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів. Не застосовувати разом з ліками, які містять центрофеноксин. Не застосовувати дітям та жінкам під час вагітності або годування груддю. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не є лікарським засобом. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому приміщенні при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 2 роки.

Пакування: 30 таблеток у картонній пачці (3 блістера по 10 таблеток)

Виробник: ТОВ «СЕНСІЛАБ Польща – С.К.А.», вул. Маріана Лангевича, 58, 95-050 Константинув Лодзький, Польща) для Юніфарм, Інк., (Unipharm, Inc.), Юридична адреса: 350 П'ята авеню, 6701, Нью-Йорк, 10118, США.